

## compilada por Heike Brieschke

Esta lista le da una idea de todas las especies de aves encontradas hasta ahora en la propiedad de Mindo Lindo (7 has), situada en el Bosque Nublado a una altura de 1.650 m en las estribaciones del noroccidente de los Andes Ecuatorianos y la probabilidad de verlas durante una visita de 3-4 días. Siguiendo el ejemplo de Mitch Lysinger de Cabañas San Isidro, se presenta un ratio de probabilidad de 1 a 6 con el 1 siendo lo más fácil a ver y el 6 lo más difícil, diseñado para los que tienen poca experiencia en observación de aves en este área y que no son familiarizados con las vocalizaciones y que no usan equipo de grabación. Las anotaciones proveen una corta información para cada especie. Si encontrarán una especie no registrada hasta ahora, por favor indíquenos. El orden taxonómico usado sigue a Ridgely, R.S. y Greenfield, P.J. 2006, Aves del Ecuador.

### ¡Disfrute su visita en *Mindo Lindo!*

\_ **Garceta Bueyera** – 1. Grupos regularmente sobrevuelan la propiedad alrededor de las 7.00 am y de las 5.00 pm.

\_ **Gallinazo Cabecirrojo** – 2. Individuos sobrevuelan la propiedad regularmente.

\_ **Gallinazo Negro** – 1. Todavía más común que el Gallinazo Cabecirrojo.

\_ **Elanio Tijereta** – 3. Sobrevuela regularmente la propiedad. En grupos bastante vocal.

\_ **Elanio Bidentado** – 6. Visto una vez en el área de entrada.

\_ **Elanio Cabecigris** – 5. Escuchado algunas veces abajo en el valle. Generalmente una especie de bajura.

\_ **Elanio Piquiganchudo** – 5. Infrecuentemente visto volando sobre el valle.

\_ **Gavilán Barreteado** – 5. Solamente pocas observaciones.

\_ **Gavilán Variable** – 6. Visto una vez sobrevolando el bosque.

\_ **Gavilán Campestre** – 1. El raptor más común. Bastante vocal.

\_ **Gavilán Aludo** – 3. Migratorio boreal regular.

\_ **Azor Semicollarejo** – 6. Visto dos veces (área de colibríes y del bambú gigante).

\_ **Halcón Montés Barreteado** – 5. Escuchado regularmente en el amanecer, pero muy difícil a ver.

\_ **Halcón Montés Collarejo** – 5. Escuchado menos regularmente en el

amanecer que el Halcón Montés Barreteado. Difícil a ver.

\_ **Cernícalo Americano** – 6. Visto una vez en el área de entrada.

\_ **Pava Crestada** – 4. Escuchada frecuentemente en el valle. A veces hay grupos en el bosque de aliso al lado de la casa.

\_ **Pava Carunculada** – 4. Escuchada regularmente en el amanecer. Vista algunas veces en el bosque de aliso al lado de la casa.

\_ **Pava Ala de Hoz** – 3. Vista regularmente desde el balcón grande.

\_ **Corcovado Dorsioscuro** – 2. Bandadas vistas y escuchadas frecuentemente en los senderos del bosque.

\_ **Paloma Collareja** – 4. En bandadas sobrevolando irregularmente.

\_ **Paloma Plomiza** – 3. Más o menos común en pareja en la propiedad.

\_ **Paloma Rojiza** – 2. Común en pareja en la propiedad. Escuchada más frecuentemente que la Paloma Plomiza.

\_ **Paloma Perdiz Rojiza** – 4. A veces vista andando en pareja en el área de la huerta.

\_ **Paloma Perdiz Goliblanca** – 5. Muy elusiva en los senderos o al lado de caja de compost.

\_ **Tórtola Orejuda** – 6. Una pareja vista una vez andando en el patio.

\_ **Paloma Apical** – 1. La especie más común de paloma en el área.

\_ **Perico Barreteado** – 4. En bandadas sobrevolantes irregularmente.

\_ **Perico Colimarrón** – 3. En pequeñas bandadas sobrevolantes o alimentándose de los frutos de los árboles de *Inga*.

\_ **Loro Piquirrojo** – 1. La especie más común de loros. Muy vocal.

\_ **Loro Alibronceado** – 6. Dos individuos vistos por primera vez en julio del 2009 al lado de la casa. Generalmente en alturas más bajas.

\_ **Cuco Ardilla** – 3. Visto y escuchado regularmente.

\_ **Garrapatero Piquiliso** – 4. Visto a veces en el pasto frente al Centro de Capacitación Ambiental.

- **Cuclillo Crespín** – 5. Rara vez visto en el área más abierta.

\_ **Autillo Rojizo** – 4. Escuchado a veces en el valle.

\_ **Mochuelo Nuboselvático** – 4. A veces visto a lado de los senderos. Escuchado regularmente.

\_ **Búho Blanquinegro** – 4. Registrado en Mindo Lindo desde 2008. Visto y escuchado a lado de la casa.

\_ **Búho Moteado** – 3. El búho más común en la propiedad. Visto y escuchado regularmente.

\_ **Guácharo** – 6. Un individuo sobrevoló la casa en 2008.

\_ **Nictibio Común** – 4. Vocaliza especialmente en noches de luna llena. Difícil a ver.

\_ **Añapero Ventrirrufo** – 3. Sobrevuela regularmente la carretera principal (área de entrada).

\_ **Añapero Común** – 6. Un individuo encontrado muerto frente de la entrada.

\_ **Chotacabras Colilira** – 5. Encontrado dos veces sentado en la carretera principal (entrada).

\_ **Pauraque** – 4. Sentado regularmente en la carretera de entrada. Más

escuchado que visto.

- \_ **Vencejo Cuelliblanco** – 1. El vencejo más común de la región.
- \_ **Vencejo Cuellicastaño** – 3. Aparece estacionalmente. Distinta voz.
- \_ **Vencejo Lomibandeado** – 5. Aparece muy irregularmente.
- \_ **Ermitaño Ventrileonado\*** - 2. Visto regularmente en el bosque. A veces en flores alrededor de la casa.
- \_ **Picolanza Frentiverde** – 4. A veces visto en flores largos y tubulares (*Ericaceae*) en el bosque y en el patio.
- \_ **Hada Orejinegra\*** - 6. Una especie de alturas bajas. Vista primera vez en Mindo Lindo en noviembre del 2008.
- \_ **Jacobino Nuquiblanco\*** - 3. Aparece estacionalmente donde los bebederos y en flores alrededor de la casa.
- \_ **Orejivioleta Parda\*** - 3. Visita a los bebederos regularmente.
- \_ **Orejivioleta Verde\*** - 4. Visita a los bebederos estacionalmente.
- **Orejivioleta Ventriazul\*** - 3. Visita a los bebederos estacionalmente.
- \_ **Coliccerda Verde\*** - 5. Aparece rara vez donde los bebederos.
- \_ **Esmeralda Occidental\*** - 5. Aparece muy irregularmente donde los bebederos.
- \_ **Ninfa Coroniverde\*** - 3. Visita a los bebederos regularmente.
- \_ **Amazilia Andina\*** - 1. Una de las especies más comunes en la propiedad y donde los bebederos.
- \_ **Amazilia Colirrufa\*** - 1. Muy común en lo abierto, rara vez en el bosque.
- \_ **Colibrí Jaspeado** – 6. Visto solamente pocas veces en el bosque.
- \_ **Puntiblanca Pechipúrpura\*** - 1. Muy común donde los bebederos.
- \_ **Brillante Pechianteado\*** - 2. Común donde los bebederos.
- \_ **Brillante Coroniverde\*** - 3. Ha aumentado su presencia donde los bebederos.
- \_ **Brillante Emperatriz\*** - 2. Regularmente donde los bebederos, pero en pequeños números.
- \_ **Estrella Coliblanca\*** - 6. Rara vez vista en la propiedad.
- \_ **Inca Pardo\*** - 2. Común donde los bebederos, pero no en gran números.
- \_ **Inca Collarrejo\*** - 5. Visto pocas veces donde los bebederos.
- \_ **Coronita Colianteado\*** - 3. Visita los bebederos regularmente.
- \_ **Coronita Aterciopelada\*** - 2. Común donde los bebederos.
- \_ **Colaespátula Zamarrito\*** - 1. Muy común en la propiedad y donde los bebederos.
- \_ **Silfo Colivioleta\*** - 1. Muy común en la propiedad y donde los bebederos.
- \_ **Colibrí Piquicuña** – 3. Visto regularmente donde las flores de *Datura* al lado de la casa.
- \_ **Solángel de Gorguera\*** - 5. Visto a veces donde los bebederos.
- \_ **Estrellita Gorjipúrpura\*** - 3. Vista regularmente donde los bebederos.
- \_ **Estrellita Ventriblanca\*** - 6. Aparece rara vez donde los bebederos.
- \_ **Trogón Collarejo** – 5. Rara vez visto y escuchado en las afueras del

bosque.

\_ **Trogón Enmascarado** – 1. Muy común alrededor de la casa y en el bosque. Muy vocal.

\_ **Quetzal Cabecidorado** – 2. Muchas veces escuchado, menos frecuentemente visto alrededor de la casa y en el bosque.

\_ **Momoto Piquiancho** – 4. Escuchado regularmente en el valle.

\_ **Momoto Rufo** – 3. Frecuentemente escuchado en el amanecer. Más fácil a ver que el Momoto Piquiancho.

\_ **Barbudo Cabecirrojo\*\*** – 4. A veces visto en los árboles de *Inga*, *Palicourea* y Pico Pico.

\_ **Barbudo Tucán** – 2. Visto y escuchado regularmente. Especialmente en el Pico Pico frente de la casa.

\_ **Tucanete Lomirrojo** – 3. Escuchado más que visto. Le gustan los frutos de la *Palicourea*.

\_ **Arasari Piquipálido\*\*** – 2. Frecuentemente en bandadas ruidosas alrededor de la casa.

\_ **Tucán de Swainson** – 4. A veces escuchado y visto en bandadas en el bosque de aliso.

\_ **Tucán de Chocó** – 2. Visto y escuchado frecuentemente alrededor de la casa.

\_ **Carpintero Pardo** – 3. Común fuera y dentro del bosque.

\_ **Carpintero Olividorado** – 2. El carpintero más común. Muchas veces fuera del bosque. Muy vocal.

\_ **Carpintero Poderoso** – 4. Regularmente visto y escuchado en pareja.

\_ **Carpintero Guayaquileño** – 5. Aparece rara vez en el bosque de aliso.

\_ **Colaespina Pizarrosa** – 4. En el pasto y matorral alrededor de las casas.

\_ **Colaespina Carirroja** – 2. Común en los espacios abiertos alrededor de las casas.

\_ **Subepalo Moteado** – 4. Difícil a ver en la última parte descendiendo al río.

\_ **Hornero del Pacífico** – 4. Aparece a veces en el área de entrada. A menudo escuchado donde los vecinos.

\_ **Limpiafronda Lineada** – 3. Visto y escuchado a menudo en el bosque.

\_ **Limpiafronda Goliescamosa** – 3. Frecuentemente en los árboles de Guayaba lleno de musgo.

\_ **Limpiafronda Frentianteada** – 4. Menos visto en el mismo área como el Limpiafronda Goliescamosa.

\_ **Trepamusgos Uniforme** – 5. Rara vez visto en el bosque más maduro.

\_ **Trepamusgos Gorrirrayado** - 4. Visto en la parte más matorral del bosque y sus afueras.

\_ **Trepatroncos Tiranino** – 5. Especialmente en el bosque más

maduro.

\_ **Trepatroncos Pardo** – 4. A veces visto en las áreas más abiertas.

\_ **Trepatroncos Piquicuña** – 4. En cualquier parte del bosque.

\_ **Trepatroncos Piquifuerte** – 2. Común, especialmente buscando alimento donde las bromelias epífitas. Muy vocal en el anochecer.

\_ **Trepatroncos Punteado** – 3. Escuchado más frecuentemente que visto.

\_ **Trepatroncos Montano** – 1. El trepatroncos más común dentro y fuera del bosque.

\_ **Batará Unicolor** – 4. Difícil a ver en la parte del bosque al lado del potrero yéndose al río.

\_ **Formicario Pechirrufo** – 3. Una de las voces más características de la zona, pero difícil a ver. Anda en los senderos.

\_ **Gralaria Escamada** – 4. Escuchado a menudo, pero difícil a ver. Anda por los senderos y en el pasto al lado de la huerta.

\_ **Gralarita Pehiocrácea** – 5. En el bosque maduro, difícil a ver.

\_ **Tapaculo de Nariño** – 3. Muy vocal, pero difícil a ver.

\_ **Tiranolete Cabecicinéreo** – 4. Bastante vocal, pero difícil a detectar.

\_ **Tiranolete Caridorado** – 3. Visto a menudo en arbustos y árboles en la parte más abierta.

\_ **Tiranolete Silbador Sureño** – 2. Visto frecuentemente en pareja en la parte abierta. Muy vocal.

\_ **Elenia Serrana** – 2. En bandadas pequeñas buscando alimento alrededor de la casa.

\_ **Tiranillo Coliblanco** – 2. Conspicuos mientras busca comida, distinta voz.

\_ **Tiranillo Alirrufo** – 4. Menos común que el Tiranillo Coliblanco. Más que todo en los alisos.

\_ **Mosquerito Olivirrayado** – 3. Bastante común buscando alimento en el estrato bajo, pero no conspicuos.

\_ **Orejerito Carijaspeado** – 3. Bastante común en la parte fuera y dentro del bosque.

\_ **Tirano Enano Bronceado** – 4. Prefiere la parte más húmeda y de musgos en el bosque. Difícil a ver.

\_ **Cimerillo Crestiescamado** – 3. Estacionalmente común, pero más escuchado que visto.

\_ **Espatulilla Común** – 4. No común. Aparece especialmente durante la estación seca.

\_ **Picoplano del Pacífico** -5. Muy inconspicuos dentro del bosque.

\_ **Mosquerito Adornado** – 1. Muy común. Algunas parejas alrededor de la casa y dentro del bosque.

\_ **Mosquerito Pechileonado** – 4. Especialmente alrededor de los riachuelos dentro del bosque.

\_ **Mosquerito Flavecete** – 5. Rara vez visto en los bordes del bosque.

\_ **Mosquerito Pechirrayado** – 4. Infrecuentemente visto en el bosque de aliso.

\_ **Pibí Occidental** – 3. Migrante boreal, relativamente común durante la estación de lluvia.

\_ **Pibí Ahumado** – 1. Muy común en el área alrededor de la casa. Muy vocal.

\_ **Pibí Boreal** – 4. Migrante boreal que aparece de vez en cuando en la parte abierta.

\_ **Atila Polimorfo** – 4. Estacionalmente muy vocal, pero a pesar de su tamaño difícil a detectar.

\_ **Copetón Crestioscuro** – 2. A menudo visto y escuchado alrededor de la casa.

\_ **Mosquero Social** – 5. Rara vez visto o escuchado en la parte abierta.

\_ **Mosquero Alicastaño** – 4. En el potrero con árboles de guayaba. No común.

\_ **Mosquero Coronidorado** – 1. El más común de los mosqueros grandes. Muy vocal.

\_ **Mosquero Pirata** – 6. Visto solamente una vez en la propiedad.

\_ **Tirano Tropical** – 2. Común al el área abierto.

\_ **Cabezón Barreteado** – 4. En pareja en el bosque, también en el potrero con guayabas.

\_ **Cabezón Canelo** – 3. El cabezón más común. Más en lo abierto que en el bosque.

\_ **Cabezón Blanquinegro** – 4. No muy común en pareja, especialmente en el campo abierto.

\_ **Cabezón Unicolor** – 4. No muy común, más en el campo abierto.

\_ **Titira Enmascarada** – 3. Aparece infrecuentemente, pero entonces bastante vocal.

\_ **Frutero Verdinegro** – 5. Inconspicuos dentro del bosque.

\_ **Frutero Escamado** – 4. No muy común dentro del bosque.

\_ **Piha Olivácea** – 5. Rara vez vista, pero a veces a lado de la casa.

\_ **Pájaro Paraguas Longuipéndulo** – 4. Visto a veces en el bosque de aliso o en árboles con frutos (*Moraceae*) en el patio!

\_ **Gallo de la Peña Andino** – 4. Ocasionalmente un macho sobrevuela el valle del río. Las hembras a veces se alimentan en un arbusto de *Palicourea* al lado del balcón grande.

\_ **Saltarín Alidorado** – 3. A menudo común dentro del bosque.

\_ **Saltarín Alitorcido** – 2. Un lek clásico se encuentra en el sendero del Manakin a 5 minutos de la casa.

\_ **Urraca Turquesa** – 6. Un individuo apareció cerca de los bebederos en Marzo del 2009.

\_ **Vireo Ojirrojo** – 2. Común por toda la propiedad.

\_ **Vireo Gorripardo** – 1. Muy común y bastante vocal.

\_ **Solitario Andino** – 3. Muy vocal, pero difícil a ver.

\_ **Zorzal de Swainson** – 2. Migrante boreal, muy común durante la estación de lluvia.

\_ **Mirlo Ojipálido** – 4. Común y maravillosa voz, difícil a ver.

\_ **Mirlo Ecuatoriano\*\*** – 2. Voz muy común y fácil a ver.

- \_ **Golondrina Azuliblanca** – 1. Omnipresente alrededor de la casa y del Centro de Capacitación Ambiental.
- \_ **Golondrina Alirrasposa Sureña** – 4. Aparece estacionalmente.
- \_ **Soterrey Caferrojizo** – 3. Visto bastante regularmente en la parte del bosque que baja al río cerca del potrero pequeño.
- \_ **Soterrey Criollo** – 1. Muy común en la parte abierta.
- \_ **Soterrey Montañes** – 3. Voz escuchada a menudo, sube más arriba en los árboles que los demás soterreyes.
- \_ **Soterrey Montés Pechigris** – 2. El soterrey muy común del estrato bajo. Muy vocal pero no fácil a ver.
- \_ **Reinita Alidorada** – 6. Migrante Boreal. Un individuo aparece cada dos años en la propiedad.
- \_ **Parula Tropical** – 1. Junto con la Candelita Goliplomiza la reinita más común en el área.
- \_ **Reinita Pechinaranja** – 2. Migrante boreal común.
- \_ **Reinita Blanquinegra** – 5. Migrante boreal, visto rara vez.
- \_ **Antifacito Coronioliva** – 4. No común en la parte de potreros. Distinta voz.
- \_ **Candelita Goliplomiza** – 1. Muy común en el campo abierto y dentro del bosque.
- \_ **Reinita Cabecilistada** – 2. Común en bandadas dentro del bosque, buscando alimento en los helechos arbóreos.
- \_ **Reinita Lomienteada** – 4. Escuchado más que visto en el valle junto al riachuelo.
- \_ **Pinchaflor Enmascarado** – 3. Más o menos común dentro y fuera del bosque.
- \_ **Pinchaflor Flanquiblanco\*\*** – 2. Común en el área abierto (flores de *Impatiens*).
- \_ **Pinchaflor Pechicanelo** – 5. Visto solamente una pocas veces en la propiedad.
- \_ **Mielereo Flavo** – 5. Un inmaduro apareció por la primera vez al final del año 2010 y trató de conseguir comida de los bebederos de los colibríes.
- \_ **Tangara Pechianteada** – 3. En pareja en la parte abierta.
- \_ **Chlorofonia Cuellidorada** – 4. Aparece en bandadas pequeñas estacionalmente (época de lluvias). Muy vocal pero difícil a detectar.
- \_ **Eufonia Piquigruesa\*\*** – 3. Escuchada más que vista. Imita a otras voces frecuentemente.
- \_ **Eufonia Lomidorada** – 4. Infrecuentemente vista en la propiedad.
- \_ **Eufonia Ventrinaranja\*\*** – 1. Muy común. Muy vocal.
- \_ **Tangara Verde Reluciente** – 4. Inconspicuos en el dosel de los árboles.
- \_ **Tangara Golirrufa** – 5. Rara vez vista en la propiedad.
- \_ **Tangara Dorada\*\*** – 1. Muy común, frecuentemente en bandadas mixtas con la Tangara Lentejuelada.
- \_ **Tangara Goliplata\*\*** – 6. Vista solamente dos veces dentro del

bosque y una vez comiendo de los bananos.

\_ **Tangara Coronizafrán** – 5. Vista raras veces en los alisos.

\_ **Tangara Cariflama\*\*** – 3. Bastante común en bandadas mixtas con otras tangaras.

\_ **Tangara Nuquidorada\*\*** – 2. Común en pareja o junto con la Tangara Verdimetálica.

\_ **Tangara Verdimetálica** – 2. Común en pareja o junto con la Tangara Nuquidorada.

\_ **Tangara Lentejuleada** – 1. Muy común en pareja, frecuentemente en bandadas mixtas con la Tangara Dorada.

\_ **Tangara Azulinegra** – 4. Aparece infrecuentemente en la propiedad.

\_ **Tangara Gorrinegra** – 3. Una especie de campo abierto. Bastante vocal.

\_ **Tangara Capuchiazul** – 3. Como la especie anterior más en lo abierto.

\_ **Tangara Montana Aliazul Norteña\*\*** – 1. Muy común y conspicuos.

\_ **Tangara Montana Barbinegra** – 5. Inconspicuos dentro del bosque.

\_ **Tersina** – 4. A veces en bandadas grandes en la parte abierta.

\_ **Tangara Azuleja\*\*** – 1. Muy vocal y común.

\_ **Tangara Palmera\*\*** – 3. Común y voz similar a la más común Tangara Azuleja.

\_ **Tangara Lomilimón\*\*** – 1. Muy común en grupos de familia en la parte abierta.

\_ **Piranga Roja** – 3. Migrante boreal bastante común.

\_ **Piranga Aliblanca** – 4. No común. Cuando visto no para equivocarse. Distinta voz.

\_ **Tangara Filiblanca\*\*** – 5. Una pareja apareció por la primera vez en diciembre del año 2010 y comió de los bananos que se provee a los pájaros alrededor de la casa.

\_ **Chlorospingo Oscuro\*\*** – 3. Bastante común, más que todo en pareja.

\_ **Chlorospingo Goliamarillo** – 4. Recién apareciendo en el bosque al lado del riachuelo.

\_ **Saltador Golianteador\*\*** – 4. No muy común en la propiedad. Generalmente en alturas más bajas.

\_ **Saltador Alinegro\*\*** – 2. Con voz común y alta, a menudo en pareja.

\_ **Picogrueso Amarillo Sureño** – 5. Infrecuentemente visto en los árboles de guayaba.

\_ **Semillerito Negriazulado** – 4. No común en los pastos.

\_ **Picogrueso Negriazulado** – 5. Rara vez visto en la parte densa del bosque.

\_ **Semillerito Cariamarillo** – 5. Aparece a veces en el pasto.

\_ **Espiguero Variable** – 4. No común en los pastos.

\_ **Espiguero Ventriamarillo** – 3. Bastante común en los pastos.

\_ **Matorralero Tricolor\*\*** – 2. Común y ruidoso en grupos pequeños en el área de arbustos.

\_ **Matorralero GorrICASTAÑO** – 4. Inconspicuos en el piso del bosque. Distinta voz.

\_ **Chingolo\*\*** – 2. Común en el área abierto alrededor de la casa y carretera de entrada.

\_ **Vaquero Brilloso** – 5. A veces en grupos en las partes abiertas.

\_ **Jilguero Encapuchado** – 4. Aparece cuando los alisos están con frutos.

\_ **Jilguero Ventriamarillo** – 4. Aparece cuando los alisos están con frutos.

\_ **Jilguero Menor** – 6. Una pareja vista una vez alimentándose en los alisos.

\* = Visitando los bebederos. Mejor tiempo de observación en el área de bebederos: diciembre hasta abril. En eso entonces se puede observar dentro de ½ hora a veces hasta 17 especies de colibríes.

Generalmente durante 2 a 2 ½ meses (usualmente comenzando en mayo) los colibríes dejan visitar los bebederos. A pesar que ellos se quedan en la propiedad, Ud. tiene que hacer más esfuerzo para verlos. A finales de julio generalmente están de regreso donde los bebederos.

\*\* = Visitando los bananos que se provee para las aves alrededor de la casa.

**Número total de especies de aves en la propiedad de Mindo Lindo: 215 (incluido 28 especies de colibríes).**

Último chequeo: Enero 2011

Queremos agradecer a Robert Jonsson, Tony Nunnery y Vinicio Pérez por sus contribuciones a esta lista.